



Preparación para cirugía ambulatoria

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de la Salud

Instrucciones después de una biopsia

1. Mantenga el vendaje seco durante _____ horas. Luego se lo puede quitar.
2. Después de quitarse el vendaje, se puede bañar. Lave la incisión con agua y jabón, luego seque con toquécitos suaves.
3. Deje las curas adhesivas “Steri-strips” en su lugar entre 7 y 10 días o hasta que se caigan.
4. Si debe aplicar Dermabond en la incisión, lea la hoja de instrucciones sobre este producto.
5. Evite realizar actividades o ejercicios agotadores durante 1 semana.
6. Tome Tylenol, Motrin o Advil si siente dolor y no le recetaron otros medicamentos.
7. Si tiene alguno de los siguientes síntomas, comuníquese con el personal médico llamando al operador de buscapersonas de los NIH al 301-496-1211:
 - Fiebre
 - Escalofríos
 - Aumento del enrojecimiento y dolor al tocar el lugar de la incisión
 - Secreción excesiva proveniente del lugar de la incisión

Contactos (Comuníquese con los miembros del personal que hay en la lista de abajo llamando al operador de buscapersonas de los NIH al 301-496-1211).



2007

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otras partes. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas sobre el Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte de los NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó, implica que dicho producto no sea satisfactorio.

National Institutes of Health
Clinical Center
Bethesda, Maryland 20892