



Instrucciones después de una endoscopia

1. Usted puede comer inmediatamente después del procedimiento.
2. Durante las próximas 48 horas:
 - Coma alimentos blandos. No coma alimentos duros y crocantes como papitas fritas o pollo frito.
 - No tome Alka-Seltzer.
 - No tome bebidas carbonadas o gaseosas (sodas).
3. Puede usar antiácidos (como Mylanta, Maalox)
4. Llame al médico de inmediato si tiene alguna de las siguientes condiciones:
 - Fiebre
 - Dolor en el pecho
 - Falta de respiración
 - Incapacidad para comer
 - Sangrado por la boca o el recto

Otras instrucciones:

Contactos (Comuníquese con los miembros del personal que hay en la lista de abajo llamando al operador de buscapersonas de los NIH al **301-496-1211**).

Su médico:



2005

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de Salud
Bethesda, MD 20892