

# ¿Dolor crónico de rótula?

Un grupo de investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) busca a personas con dolor de rótula (también llamado dolor patelofemoral o de la parte anterior de la rodilla). Estudiamos cómo la debilidad muscular alrededor de la rodilla puede llevar a cambios en la movilidad y el dolor de la rótula.



## Los participantes del estudio se someterán a lo siguiente:

- dos consultas externas que durarán aproximadamente de 3 a 5 horas cada una;
- un examen físico y una evaluación clínica de la rodilla;
- cuestionarios sobre el dolor de rodilla;
- exploraciones con IRM de la rodilla mientras está quieta y en movimiento.

## Los participantes aptos deben cumplir los siguientes requisitos:

- tener de 18 a 55 años;
- tener un diagnóstico de dolor de rótula O haber presentado dolor intenso de rótula por más de seis meses;
- poder someterse a IRM;
- NO tener antecedentes de lesiones graves de rodilla (p. ej., lesión de ligamento), enfermedades de la rodilla (p. ej., artritis) o cirugías (p. ej., reparación del ligamento cruzado anterior).

**Ubicación:** el Centro Clínico de los NIH, Hospital de investigación de los Estados Unidos, está en Bethesda (Maryland). Línea roja del Metro (estación: Medical Center).

**Oficina de Reclutamiento de Pacientes del Centro Clínico de los NIH**

**1-800-411-1222** (mencione el estudio 13-CC-0099)

TTY para personas sordas: 1-866-411-1010

PRPL@cc.nih.gov

<https://go.usa.gov/xP5mr>

